



ARTÍCULO DE REVISIÓN

El entrenamiento físico restaura la variabilidad del ritmo cardiaco en la insuficiencia cardiaca. Revisión sistemática



Victoria Segovia ^{a,b}, Carlos Manterola ^{c,d}, Marcelo González ^e e Iván Rodríguez-Núñez ^{a,f,*}

^a Programa de Magíster en Kinesiología Cardiorrespiratoria, Escuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Sebastián, Concepción, Chile

^b Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile

^c Departamento de Cirugía y CEMyQ, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile

^d Centro de investigaciones biomédicas, Universidad Autónoma de Chile, Temuco, Chile

^e Laboratorio de Fisiología Vascular, Departamento de Fisiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción Chile

^f Laboratorio de Biología del Ejercicio, Escuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Sebastián, Concepción, Chile

Recibido el 9 de agosto de 2016; aceptado el 1 de diciembre de 2016

PALABRAS CLAVE

Entrenamiento;
Ejercicio;
Insuficiencia
cardiaca;
Sistema nervioso
autónomo;
Chile

Resumen Las enfermedades cardiovasculares constituyen una causa importante de morbi-mortalidad en la población general. En este sentido el desbalance autonómico forma parte del cuadro fisiopatológico que subyace al desarrollo de estas enfermedades. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del entrenamiento físico sobre la variabilidad del ritmo cardiaco (VRC) en pacientes con insuficiencia cardiaca.

Metodología: Se realizó una revisión sistemática de la literatura. Fueron considerados ensayos clínicos con asignación aleatoria, estudios cuasiexperimentales con grupo control equivalente, estudios cuasiexperimentales sin grupo control y con análisis pre- y postintervención, y estudios cruzados, con períodos de entrenamiento y desentrenamiento asignados de manera aleatoria. Se calcularon las diferencias medias estandarizadas entre los parámetros de VRC pre- y postintervención para el grupo control y experimental.

Resultados: En el análisis intrasujeto del grupo control, no se observó significación estadística en las diferencias medias estandarizadas entre el valor preintervención y el postintervención de los parámetro de VRC. En el grupo experimental, las diferencias medias estandarizadas fueron estadísticamente significativas para la raíz cuadrada del promedio de las diferencias al cuadrado entre intervalos R-R adyacentes ($+0.468 \pm 0.215$; $p = 0.032$) y las bandas de alta (HF) (0.934 ± 0.256 ; $p < 0.001$) y baja (LF) (0.415 ± 0.096 ; $p < 0.001$) frecuencia; así como para el índice LF/HF (-0.747 ± 0.369 ; $p = 0.044$). Por otra parte, tan solo 3 estudios entraron en el

* Autor para correspondencia. Edificio los Maitenes 4.^º piso. Lientur 1457, Universidad San Sebastián, Concepción.

Correo electrónico: ivan.rodriguez@uss.cl (I. Rodríguez-Núñez).

metaanálisis de estudios comparativos. En el metaanálisis de estudios comparativos se observó un efecto favorable al grupo experimental para las variables: LF/HF ($-2.21 \pm \text{IC } 95\%: -3,83 \text{ a } -0.60$), HF y LF.

Conclusión: El entrenamiento físico fue efectivo en mejorar la VRC y restableció el balance autonómico en pacientes con insuficiencia cardiaca.

© 2016 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Publicado por Masson Doyma México S.A. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

KEYWORDS

Training;
Exercise;
Heart failure;
Autonomic nervous system;
Chile

The exercise training restores the heart rate variability in heart failure patients. A systematic review

Abstract Cardiovascular diseases are a significant cause of morbidity and mortality in the general population. In this sense, the autonomic imbalance is the cornerstone of the pathophysiology underlying the development of these diseases. The aim of this study was to determine the efficacy of exercise training on heart rate variability (HRV) in adult patients with chronic heart failure.

Methodology: A systematic literature review was conducted in electronic databases. The considered studies were randomised clinical trials, quasi-experimental studies with non-randomised control group, quasi-experimental studies with analysis of pre- and post- intervention, and crossover studies with randomly assigned training and non-training periods. The standardised mean differences were calculated between pre- and post-intervention in both the control and experimental group.

Results: Within-subject analysis of the control group showed no statistical significance in the standardised mean differences of HRV. In the experimental group, the standardised mean differences were positive for the root mean square of successive difference ($+0.468 \pm 0.215$; $P = .032$), high frequency band (HF) (0.934 ± 0.256 ; $P < .001$) and low frequency band (LF) ($< 0.415 \pm 0.096$; $P = .001$). Moreover, the standardised mean difference was negative for LF/HF (-0.747 ± 0.369 , $P = <.044$). On the other hand, only 3 studies entered the comparative meta-analysis. The effect of exercise training was favourable for the experimental group in LF/HF ($-2.21 \pm 95\% \text{ CI: } -3.83 \text{ to } -0.60$), HF, and LF.

Conclusion: The exercise training was effective in increasing HRV and restoring the autonomic balance in patients with heart failure.

© 2016 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Published by Masson Doyma México S.A. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares son un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, sin distinción de sexo, edad, raza o etnia. Son la causa principal de muerte a nivel mundial con 17.3 millones de muertes por año, para el año 2030 se espera que aumente a más de 23.6 millones^{1,2}. En el 2012 murieron por esta causa 17.5 millones de personas, lo cual representa un 31% de las muertes registradas en el mundo. De estas, 7.4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria y 6.7 millones a accidente cerebrovascular³.

Una de las enfermedades cardiovasculares más prevalentes en la población corresponde a la insuficiencia cardiaca (IC), la cual constituye un síndrome clínico complejo que resulta de un trastorno morfológico y/o funcional que afecta la capacidad ventricular para llenar o expulsar sangre^{4,5}. Presenta una incidencia de 10 por cada 1,000 habitantes después de los 65 años^{1,6}. Como factores etiológicos de la IC se encuentran la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía

isquémica asociada con un infarto previo y la miocardiopatía dilatada^{7,8}.

En la IC, el corazón no puede responder adecuadamente a la demanda sanguínea⁹. Adicionalmente, la reducción del gasto cardíaco puede ocasionar congestión pulmonar y edema periférico, comprometiendo significativamente la tolerancia al ejercicio, la capacidad funcional y la calidad de vida¹⁰. Adicionalmente, en la IC existen cambios moleculares y endocrinos que se asocian a la depresión de la función sistólica. Estos se caracterizan por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y la simpaticoexcitación¹¹, las cuales van a promover la remodelación del ventrículo izquierdo^{12,13}.

Adicionalmente, diversos estudios han establecido la existencia de desregulación de los mecanismos de control cardiovascular, lo cual ha quedado en evidencia mediante la disminución de la variabilidad del ritmo cardíaco (VRC) observada en estos pacientes^{14,15}. Estos parámetros han sido considerados importantes predictores de gravedad en este grupo de pacientes¹⁶⁻¹⁹.

Por otra parte, hoy en día es aceptado que el ejercicio físico (EF) posee importantes efectos cardioprotectores en este grupo de pacientes^{20,21}. Estos han sido asociados con la activación de diversos mecanismos dirigidos al restablecimiento de la función miocárdica y reversión del desbalance autonómico²²⁻²⁵.

Diversos estudios han revelado que el EF incrementaría la VRC en pacientes con IC^{26,27}. No obstante, si realmente el EF mejora la VRC y restaura el balance autonómico no ha sido estudiado mediante una revisión sistemática (RS). Por este motivo, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto del entrenamiento sobre la variabilidad del ritmo cardiaco en pacientes con IC crónica.

El manuscrito se desarrolló siguiendo las normas PRISMA, para el reporte de RS²⁸.

Material y métodos

Diseño

El presente estudio corresponde a una RS.

Criterios de elegibilidad de los artículos primarios

Fueron considerados estudios realizados en humanos, sin restricción idiomática ni año de ejecución, cuyo diseño fuese: ensayos clínicos con asignación aleatoria (EC), estudios cuasiexperimentales con grupo control equivalente, estudios cuasiexperimentales sin grupo control y con análisis pre- y postintervención; y estudios cruzados, con períodos de entrenamiento y desentrenamiento asignados de manera aleatoria.

Sujetos de estudio

Los sujetos de estudio fueron caracterizados como adultos de ambos géneros, con diagnóstico de IC al momento de la intervención.

Intervención

Como intervención fue considerada una o más de las siguientes modalidades de entrenamiento: EF aeróbico continuo por al menos 20 min de intensidad baja < 40%, moderada entre el 40 y 80%; ejercicio interválico de alta intensidad, el cual debía contener períodos breves de ejercicio a una intensidad superior al 80% e intervalos a intensidades entre el 40-60%; y el entrenamiento basado en ejercicios de fortalecimiento muscular.

El protocolo de entrenamiento debía ser dosificado de acuerdo a algún parámetro fisiológico de referencia como VO₂máx, VO₂ pico, frecuencia cardiaca de reserva, frecuencia cardiaca pico o trabajo máximo. Adicionalmente, fue considerado un período mínimo de 4 semanas de entrenamiento, el cual debía ser finalizado por al menos el 20% de la muestra inicial.

Se excluyeron aquellos estudios que agruparon los datos de adultos con otras enfermedades cardiovasculares y/o

metabólicas en los que no se realizó análisis por subgrupos. También se excluyeron aquellos estudios realizados en menores de 18 años.

Variables de interés

Como variables de interés fueron considerados los parámetros de VRC del dominio tiempo y dominio frecuencia. Solo fueron considerados aquellos estudios que reportaron registros continuos en condiciones de reposo, diurno o nocturno, por períodos ≥ 5 min²⁹.

Del dominio tiempo fueron considerados el intervalo R-R, el índice desviación estándar de todos los intervalos R-R, el índice raíz cuadrada del promedio de la suma de las diferencias al cuadrado, entre intervalos R-R adyacentes (RMSSD). Por su parte, del dominio frecuencia fueron considerados los componentes espectrales obtenidos mediante análisis de poder espectral autorregresivo o transformación rápida de Fourier. Así, fue considerado el poder espectral en la banda de alta frecuencia (HF) (0.15–0.4 Hz) y baja frecuencia (LF) (0.04-0.15 Hz) en valores absolutos (ms²) y unidades normalizadas (nu). Adicionalmente fue considerada la relación LF/HF²⁹.

Búsqueda de artículos

La búsqueda de artículos se realizó en las bases de datos MEDLINE, ProQuest, Scientific Electronic Library Online (SciELO), TripDatabase, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), SPORTDiscus, Rehabilitation and Sports Medicine Source (R&SMS), Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL). Fueron considerados artículos desde su ingreso a la base de datos hasta el 21 de julio de 2016.

Fueron utilizados los términos descriptores médicos (Medical Subject Headings [MeSH]): entrenamiento, rehabilitación, ejercicio, sistema nervioso simpático e insuficiencia cardiaca; y los términos libres: entrenamiento físico, control autonómico, balance autonómico, modulación autonómica, variabilidad del ritmo cardiaco. También se utilizaron los operadores booleanos AND y OR. La búsqueda sistemática fue realizada en 2 ocasiones en las bases de datos mencionadas. La primera se efectuó el 1 de noviembre de 2015 y la segunda el 21 de julio de 2016.

Identificación de los artículos

Se revisaron los títulos y los resúmenes de los artículos atingentes. Luego se obtuvieron los textos extensos de aquellos resúmenes que cumplieron con los criterios de elegibilidad. Los datos fueron enmascaradamente extraídos por 2 investigadores independientes (VS, IR) y registrados en una planilla ad hoc. Se registró el nombre del autor, año de publicación, tipo de diseño, lenguaje de publicación, tamaño de la muestra, edad de los sujetos, protocolo de entrenamiento, modalidad de entrenamiento, intensidad de ejercicio, duración del entrenamiento, parámetros considerados para el

análisis de VRC, las condiciones del registro, duración del registro y el método utilizado para el registro.

Evaluación de la calidad metodológica y riesgo de sesgo

La calidad metodológica (CM) fue evaluada de manera independiente por 2 revisores (VS, IR) a través de la escala PEDro, las discrepancias fueron resueltas por consenso. Los artículos primarios fueron categorizados de acuerdo a su CM como «excelentes» si presentaron una puntuación de 9-11; de «buena calidad», si presentaron un puntaje de 6-8; de calidad «regular», si presentaron una puntuación de 4 o 5; mientras que los estudios con una puntuación por debajo de 4 fueron categorizados como «mala» CM.

El riesgo de sesgo fue evaluado en todos los artículos primarios por los investigadores (VS, IR) de acuerdo a las recomendaciones sugeridas por el manual Cochrane para RS³⁰. De este modo, fue determinada la existencia de riesgo de sesgo de selección, de realización, de detección, de desgaste y de notificación en los estudios incluidos.

Síntesis de datos y análisis estadístico

Se realizó análisis descriptivo de los datos con cálculo de promedios ponderados para las variables cuantitativas y porcentajes para las variables cualitativas. Con el fin de combinar los datos de los artículos primarios fueron calculadas las diferencias medias estandarizadas (DME) entre los valores de los parámetros pre- y postintervención, tanto en el grupo control como en el experimental³¹⁻⁴¹. En los estudios con diseño cruzado fue considerado como grupo control el período de desentrenamiento de la muestra estudiada^{34,35}. Adicionalmente, fue comparada la magnitud del efecto entre grupos en aquellos estudios comparativos (ECA y estudios cuasiexperimentales con grupo control equivalente) que reportaron los mismos parámetros de enfermedad cardiovascular³⁶⁻⁴¹. Esto se realizó mediante el cálculo de las DME de la magnitud del efecto entre el grupo control y experimental.

El metaanálisis fue realizado de acuerdo al modelo de efectos aleatorios y la heterogeneidad fue determinada mediante el cálculo del coeficiente I^2 , el cual, fue calculado como $I^2 = 100\% \times (Q \times df)/Q$; donde Q es el coeficiente Cochrane y df son los grados de libertad.

El análisis estadístico fue realizado con el software RevMan 5.3 y fue considerado un valor de $p < 0.05$ como significativo.

Resultados

Selección de los estudios

Las estrategias de búsqueda arrojaron un total de 1,257 artículos desde las 8 bases de datos consultadas. En la figura 1 se describe la secuencia de búsqueda sistemática y las razones de la exclusión. Un total de 11 artículos fueron finalmente considerados para la revisión (fig. 1).

Características de los artículos primarios

Todos los artículos fueron escritos en inglés. El rango de años de las publicaciones fue entre 1995 y 2014. El tamaño de la muestra encontrado en los artículos analizados fue entre 6 y 57 participantes. La población de los 11 estudios representa a un total de 352 sujetos, de ellos 92 integraron el grupo control y 260 el grupo experimental. Por otro lado, 226 (86.9%) fueron hombres y 69 (26.5%) mujeres. En los 11 (100%) artículos se describieron los rangos de edad. El promedio ponderado de la edad fue 60.7 años (mínima de 49.3 y máxima de 10.7 años).

Cinco de los 11 estudios son EC³⁶⁻⁴⁰, un estudio es cuasiexperimental con grupo control equivalente⁴¹, 3 estudios son estudios cuasiexperimentales sin grupo control y con análisis pre- y postintervención³¹⁻³³ y los otros 2 son estudios cruzados, con períodos de entrenamiento y desentrenamiento asignados de manera aleatoria^{34,35}. Por otra parte, de los estudios comparativos, 5 compararon al efecto del entrenamiento físico con relación a un grupo control sedentario³⁶⁻⁴⁰, y uno comparó el efecto del entrenamiento continuo de intensidad moderada con el entrenamiento interválico de alta intensidad³⁶.

Con relación a las características del entrenamiento, en 6 artículos ($N=126$) la modalidad de entrenamiento empleada fue cicloergómetro, en uno ($N=30$) cicloergómetro y treadmill, en uno ($N=31$) caminata y ciclismo, en uno ($N=19$) entrenamiento de fuerza con resistencia hidráulica, en uno ($N=13$) entrenamiento combinado caminata, step y bicicleta o fuerza y en otro ($N=41$) entrenamiento físico general de modalidad no especificada. Respecto a la intensidad de ejercicio, en 8 artículos se evaluó el efecto del entrenamiento continuo de intensidad moderada^{32,34,35,37,38,40,41}, en un artículo se evaluó el efecto de entrenamiento de intensidad moderada y entrenamiento interválico de alta intensidad³⁶, en un artículo se evaluó ejercicio continuo de baja intensidad y el efecto del entrenamiento de fuerza³³ y en otro, el efecto del entrenamiento de fuerza³⁹.

Respecto a las características del registro del intervalo R-R; en 10 de los 11 artículos se realizó Holter de electrocardiograma, en 3 de ellos se evaluó durante 24 h; en uno, durante 20 h; en otro, durante 20 min; en otro, durante 12 min; en 2 artículos, durante 10 min; y en los 2 restantes, durante 5 min. Por otro lado, en un artículo se reportó la duración del registro en número de latidos por minuto. De los estudios analizados, 6 realizaron análisis de variables en dominio frecuencia; en otro, del dominio tiempo; y en 4 artículos, se analizaron ambas bandas de frecuencia (tabla 1).

Calidad metodológica y riesgo de sesgo

La CM de los artículos primarios se ubicó en un rango de 5-7 puntos de la escala PEDro. Así, 3 artículos presentaron una CM de 5 puntos; 3, una CM de 6 puntos; y 4, una CM de 7 puntos. Por otra parte, en la figura 2 se puede apreciar el riesgo de sesgo de los artículos primarios; en ella se nota que un alto porcentaje de los artículos presentó un elevado riesgo de sesgo de selección, y por otro lado, el sesgo de

Tabla 1 Características de los estudios

Autor	Diseño	n (M/F)	Edad	Protocolo de entrenamiento	Modalidad de entrenamiento	Intensidad de ejercicio	Duración del entrenamiento (semanas)	Parámetros de variabilidad del ritmo cardiaco medidos	Condiciones de registro	Duración del registro	Equipo utilizado	Calidad metodológica
Kiilavuori et al., 1995 ⁴⁰	EC	8 (8/0)	52	Continuo	Cicloergómetro	50-60% del VO ₂ pico	12	HF, LF, VLF, LF/HF	Día y noche Día en actividad cotidiana, Día Supino	20 h	ECG	7
Radaelli et al., 1996 ³⁵	ECr	6 (6/0)	50	Continuo	Cicloergómetro	60-70% del VO ₂ máx	5	LF/HF	Día Supino	5 min	ECG	6
European Heart Failure Training Group, 1998 ³⁴	ECr	57 (NE)	60.5	Continuo	Cicloergómetro	70-80% de la FC pico	16	HF, LF	Día Supino	640 latidos sucesivos	Registro sonoro del ritmo cardiaco	6
Pietila et al., 2002 ³³	EQE-PP	13 (12/1)	58.2	Continuo Fuerza	Caminar, step, bicicleta, pesas	Baja intensidad	12	HF, LF, R-R	Día Supino	5 min	ECG	5
Malfatto et al., 2002 ⁴¹	EQE-GC	30 (26/4)	62	Continuo	Cicloergómetro, treadmill, calistenia	40-50% VO ₂ pico	12	LF/HF	Día Supino Bípedo	10 min 10 min	ECG	6
Selig et al., 2004 ³⁹	EC	19 (15/4)	65	Fuerza	Resistencia hidráulica	Moderada intensidad	12	HF (un), LF (un), R-R, LF/HF, SDNN, RMSSD	Día Supino	20 min	ECG	7
Larsen et al., 2004 ³²	EQE-PP	12 (12/0)	65	Continuo	Cicloergómetro	80% de VO ₂ pico	12	HF, LF, VLF, LF/HF, SDNN, RMSSD, PNN50	Día y noche Día en actividad cotidiana	24 h	ECG	5
Piotrowicz et al., 2009 ³¹	EQE-PP	41 (39/2)	58.7	Continuo	Entrenamiento físico general de modalidad no especificada	40-60% VO ₂ pico	8	HF, LF, R-R, LF/HF	Día y noche Día en actividad cotidiana	24 h	ECG	5
Ricca- Mallada et al., 2012 ³⁸	EC	10 (8/2)	59	Continuo	Cicloergómetro	80% de la FC máx	24	HF, LF, R-R, SDNN	Día Supino	12	ECG	7
Murad et al., 2012 ³⁷	EC	31 (11/20)	68	Continuo	Caminar, ciclismo	40-70% frecuencia cardíaca de reserva	16	SDNN, RMSSD	Día Supino	10	ECG	7
Koufaki et al., 2014 ³⁶	EC	17 (13/4)	59.7	Continuo	Cicloergómetro	CAT = 40-60% VO ₂ máx	24	LF/HF, SDNN	Día y noche Día en actividad cotidiana	24 h	ECG	6
		16 (14/2)	59.8	Intervalos		HIT = 30 s 100% de carga en MSEC						

EC: ensayos clínicos con asignación aleatoria; ECG: electrocardiograma; ECr: estudios cruzados, con períodos de entrenamiento y desentrenamiento asignados de manera aleatoria; EQE-CG: estudios cuasiexperimentales con grupo control equivalente; EQE-PP: estudios cuasiexperimentales sin grupo control y con análisis pre- y postintervención; F: femenino; FC: frecuencia cardíaca; HF: alta frecuencia; LF: baja frecuencia; LF/HF: relación LF/HF; M: masculino; NE: no especificado; RMSSD: raíz cuadrada del promedio de la suma de las diferencias al cuadrado, entre intervalos R-R adyacentes; R-R: intervalos R-R; SDNN: desviación estándar de todos los intervalos R-R.




Figura 1 Resultado de la búsqueda sistemática de artículos científicos. VRC: variabilidad del ritmo cardíaco.

desgaste y de reporte fueron los menos prevalentes entre los estudios primarios ([fig. 2](#)).

Efecto del entrenamiento físico sobre la variabilidad del ritmo cardíaco

En el análisis intrasujeto del grupo control, no se observó significación estadística en las DME entre el

valor preintervención y postintervención de los parámetro de VRC. En el grupo experimental, las DME fueron estadísticamente significativas para las variables RMSSD, HF, LF, y LF/HF; observándose DME positiva para RMSSD ($+0.468 \pm 0.215$; $p = 0.032$), HF (0.934 ± 0.256 ; $p < 0.001$), LF (0.415 ± 0.096 ; <0.001) y negativa para LF/HF (-0.747 ± 0.369 ; $p = 0.044$) ([tabla 2](#)).

Por otra parte, tan solo 3 estudios entraron en el metaanálisis de estudios comparativos^{38,40,41}. En ellos se observó





Figura 2 Riesgo de sesgo de los artículos primarios.

Tabla 2 Metaanálisis del efecto intrasujeto del entrenamiento físico sobre los parámetros de variabilidad del ritmo cardiaco en pacientes con insuficiencia cardíaca


Variable	k	n	DME (EE)	IC 95%	I^2 (%)	Valor de p
<i>Control</i>						
R-R	2	30	-0.115 (0.252)	-0.620 a 0.390	0	0.651
SDNN	3	65	-00761 (0.173)	-0.349 a 0.334	0	0.965
RMSD	2	55	0.134 (0.188)	-0.240 a 0.507	0	0.480
HF	2	22	1.2 (1.797)	-2.389 a 4.866	95.82	0.495
LF	2	22	0.09 (0.294)	-0.503 a 0.684	58.47	0.879
LF/HF	3	32	0.932 (0.551)	-0.162 a 2.025	84.03	0.094
<i>Entrenamiento físico</i>						
R-R	4	83	0.690 (0.396)	-0.0378 a 1.418	78.01	0.063
SDNN	6	105	0.198 (0.136)	-0.0692 a 0.465	0	0.145
RMSD	2	43	0.468 (0.215)	0.0413 a 0.895	0	0.032
HF	6	141	0.958 (0.275)	0.417 a 1.498	73.8	0.001
LF	6	141	0.386 (0.119)	0.153 a 0.620	0	0.001
LF/HF	8	149	-0.747 (0.369)	-1.473 a -0.0204	88	0.044

DME: diferencia media estandarizada; EE: error estándar; HF: alta frecuencia; I^2 : porcentaje de inconsistencia; IC 95%: intervalo de confianza del 95%; LF: baja frecuencia; LF/HF: relación LF/HF; RMSD: raíz cuadrada del promedio de la suma de las diferencias al cuadrado, entre intervalos R-R adyacentes; R-R: intervalos R-R; SDNN: desviación estándar de todos los intervalos R-R.

A. Variable de interés LF



B. Variable de interés HF



C. Variable de interés LF/HF




Figura 3 Gráfico de bosque del metaanálisis de efectos aleatorios con relación al efecto del entrenamiento físico sobre los parámetros de variabilidad del ritmo cardiaco. En A, banda de baja frecuencia (LF: low frequency); B, banda de alta frecuencia (HF: high frequency) y C, relación LF/HF.

una DME favorable al grupo experimental para las variables del dominio frecuencia: LF/HF ($-2.21 \pm$ intervalo de confianza del 95% -3.83 a -0.60), HF y LF. No fue posible realizar metaanálisis de las variables del dominio tiempo (fig. 3).

Discusión

El presente estudio fue realizado con el fin de evaluar, a través del resumen de la evidencia mediante una RS, el impacto

del EF sobre los parámetros del dominio tiempo y dominio frecuencia de la VRC de sujetos adultos con IC. Dada la gran diversidad de modalidades de EF existentes, se agrupó los artículos considerando todas las modalidades de entrenamiento como una sola intervención, con el fin de establecer conclusiones estadísticas para esta intervención de modo general.

Es así como los principales hallazgos del estudio fueron que los individuos que realizaron algún tipo de EF

incrementaron la magnitud de las variables del dominio tiempo, principalmente la variable RMSSD; así como los componentes espectrales de las bandas de alta y baja frecuencia. Adicionalmente, fue posible constatar una reducción significativa de la relación LF/HF en los sujetos entrenados, lo cual es sabido que se asocia fuertemente con el restablecimiento en el balance autonómico hacia un predominio parasimpático. Este fenómeno no fue observado en los sujetos que recibieron tratamiento médico convencional sin EF, lo cual concuerda con aquellos estudios en los que se ha evaluado el efecto del EF sobre el control autonómico del paciente con IC, tanto de RS cualitativas, como ensayos clínicos^{27,42}.

Vale la pena destacar que la VRC es un marcador electrocardiográfico no invasivo que representa el control fino del sistema cardiovascular, latido a latido, el cual es mediado por mecanismos autonómicos y barorreflejos⁴³.

Los parámetros de la VRC de dominio de tiempo reflejan la modulación autonómica del componente parasimpático, específicamente el parámetro RMSSD^{32,37,39}. En nuestro estudio, se pudo observar que el único parámetro del dominio tiempo que mostró cambios significativos posterior a la intervención fue la variable RMSSD, lo cual, muestra que el EF no solamente induce respuestas simpático-inhibitorias, sino también parasimpático-excitatorias en los mecanismos de control cardiovascular de estos pacientes.

Por otro lado, en análisis del dominio de frecuencia se ha establecido que el componente HF representa actividad parasimpática, mientras que el LF representa la actividad tanto simpática como parasimpática. Así, la relación LF/HF se asocia íntimamente con el equilibrio autonómico en los mecanismos de control del sistema cardiovascular^{31-36,38-41}. En nuestro estudio se observó que el EF incrementa la varianza de ambos componentes espectrales (HF y LF), no obstante, la magnitud de este incremento fue mayor en la banda HF, comparado con la LF, lo cual redujo significativamente la relación LF/HF en los pacientes con IC posterior a la intervención (tabla 1). Esto fue además confirmado en el metaanálisis de estudios comparativos (fig. 3), reafirmando la idea de que el EF restaura el balance autonómico en este grupo de pacientes.

En la IC los cambios hemodinámicos asociados a la alteración en la función cardiaca están determinados por la activación del sistema nervioso simpático y la inhibición del sistema nervioso parasimpático, contribuyendo directamente a la progresión de la IC. Una de las primeras respuestas a la lesión miocárdica es la activación del sistema nervioso simpático; este corazón dañado presenta cambios en la actividad de las fibras aferentes y las fibras eferentes del sistema nervioso autónomo contribuirán al desequilibrio simpático-vagal, reflejado por una VRC disminuida⁴⁴. Esta disminución genera como consecuencia una menor capacidad de adaptación fisiológica, lo cual incrementa el riesgo de taquiarritmias ventriculares y muerte súbita^{16,17}. Por lo tanto, el EF, mediante el incremento en la VRC y el restablecimiento del balance autonómico⁴⁵, podría contribuir significativamente a la prevención de estos fenómenos fisiopatológicos, lo cual impactaría significativamente en el pronóstico de la IC^{46,47}.

Este estudio presenta ciertas debilidades que deben ser discutidas. Entre ellas vale la pena mencionar que, si bien es cierto que la mayoría de los artículos primarios fueron

categorizados como de «buena» CM (66.6%), un alto porcentaje de ellos presentaron un alto riesgo de sesgo de selección, de detección, así como otros potenciales sesgos, los cuales fueron principalmente asociados al desarrollo del protocolo experimental. Adicionalmente, la mayoría de los artículos primarios considerados evaluaron pequeños grupos de sujetos y presentaron gran heterogeneidad en los diferentes protocolos de entrenamiento realizados, lo cual obligó a considerar el «entrenamiento físico» como una sola intervención indistintamente de la modalidad empleada. En consecuencia, los alcances de los resultados de este estudio solo pueden considerar la intervención basada en EF general y no pueden dirigirse a una modalidad específica de EF. Por otro lado, las características del análisis espectral y los métodos de reporte de los parámetros de VRC difirieron entre los estudios. Mientras que algunos solo consideraron el dominio tiempo, otros únicamente estimaron el dominio frecuencia y escasamente fueron considerados ambos métodos de análisis, lo cual dificultó el análisis comparativo entre los resultados de los artículos primarios.

Deberían conducirse nuevos estudios con el propósito de determinar los mejores métodos y modalidades de entrenamiento para producir mejoras sobre los mecanismos de control cardiovascular y VRC. En este sentido, algunos estudios han revelado la existencia de diferentes mecanismos inducidos por las distintas modalidades de entrenamiento en este grupo de pacientes²⁷; por lo tanto, si estos efectos son transferidos a los mecanismos autonómicos de control cardiovascular, sería de gran interés establecer el protocolo de entrenamiento que produce una mayor magnitud de efectos en este grupo de pacientes. Esto contribuiría significativamente a los métodos de dosificación del entrenamiento físico en el contexto clínico actual.

De acuerdo a la evidencia existente es posible concluir que protocolos de entrenamiento físico superiores a 4 semanas parecen incrementar la VRC y restablecer el desbalance autonómico de individuos adultos con IC crónica. Se requiere un mayor número de estudios experimentales y de mejor CM.

Financiación

No existen fuentes de financiamiento formal.

Conflictos de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart disease and stroke statistics-2015 update: A report from the American Heart Association. *Circulation*. 2015;29-322.
- Departamento de Enfermedades No Transmisibles. Enfoque de riesgo para la prevención de enfermedades cardiovasculares, Consenso 2014. Minist. Salud, Gob. Chile. 2014:1-63.
- Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva. Enero 2015.
- McMurray JJV, Adamopoulos S, Anker SD, et al. Guía de práctica clínica de la ESC sobre diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica 2012. *Rev Española Cardiol*. 2012;65:938e1-59.
- Hunt SA, Abraham WR, Chin MH, et al., American College of Cardiology; American Heart Association Task Force on Practice

- Guidelines; American College of Chest Physicians; International Society for Heart and Lung Transplantation; Heart Rhythm Society. ACC/AHA 2005 guideline update for the diagnosis and management of chronic heart failure in the adult: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (writing committee to update the 2001 guidelines for the evaluation and management of heart failure): Developed in collaboration with the American College of Chest Physicians and the International Society for Heart and Lung Transplantation: Endorsed by the Heart Rhythm Society. *Circulation*. 2005;112:e154–235.
6. Atkins CE. Advances in the management of heart failure. *2007;57:163–70.*
 7. Ziaeian B, Fonarow GC. Epidemiology and aetiology of heart failure. *Nat Rev Cardiol.* 2016;13:368–78.
 8. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al., American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. ACCF/AHA practice guideline 2013 ACCF /AHA Guideline for the Management of Heart Failure A Report of the American College of Cardiology Foundation /American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *Circulation*. 2013;128:e240–327.
 9. Ulate-montero G, Ulate-campos A, Rica DC. Actualización en los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardiaca [Update in physiopathological mechanisms in heart failure]. *Acta Med Costarric.* 2008;50:5–12.
 10. Gehi A, Pinney S, Gass A. Recent diagnostic and therapeutic innovations in heart failure management. *Mt Sinai J Med.* 2005;72:176–84.
 11. Fahim M. Cardiovascular sensory receptors and their regulatory mechanisms. *Indian J Physiol Pharmacol.* 2003;47:124–46.
 12. Braunwald E, Bonow R. Tratado de cardiología. Texto de medicina cardiovascular, capítulo 25. 9.^a ed. 2013. Elsevier, España.
 13. Heart Failure Society of America. Executive summary: HFS 2006. Comprehensive heart failure practice guideline. *J Card Fail.* 2006;12:10–38.
 14. La Rovere MT, Pinna GD, Maestri R, et al. Short-term heart rate variability strongly predicts sudden cardiac death in chronic heart failure patients. *Circulation.* 2003;107:565–70.
 15. Sandercock GRH, Brodie DA. The role of heart rate variability in prognosis for different modes of death in chronic heart failure. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2006;29:892–904.
 16. Danitowicz-Szymanowicz L, Suchecka J, Niemirycz-Makurat A, et al. Autonomic predictors of hospitalization due to heart failure decompensation in patients with left ventricular systolic dysfunction. *PLoS One.* 2016;11:e0152372.
 17. Guzzetti S, la Rovere MT, Pinna GD, et al. Different spectral components of 24 h heart rate variability are related to different modes of death in chronic heart failure. *Eur Heart J.* 2005;26:357–62.
 18. Shahbazi F, Asl BM. Generalized discriminant analysis for congestive heart failure risk assessment based on long-term heart rate variability. *Comput Methods Programs Biomed.* 2015;122:191–8.
 19. Smilde TDJ, van Veldhuisen DJ, van den Berg MP. Prognostic value of heart rate variability and ventricular arrhythmias during 13-year follow-up in patients with mild to moderate heart failure. *Clin Res Cardiol.* 2009;98:233–9.
 20. Berent R, Von Duvillard SP, Crouse SF, et al. Resistance training dose response in combined endurance-resistance training in patients with cardiovascular disease: A randomized trial. *Arch Phys Med Rehabil.* 2011;92:1527–33.
 21. Achttien RJ, Staal JB, van der Voort S, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: A practice guideline. *Netherlands Hear J.* 2013;21:429–38.
 22. Wilson MG, Ellison GM, Cable NT. Basic science behind the cardiovascular benefits of exercise. *Heart.* 2015;101:758–65.
 23. Arbab-Zadeh A, Perhonen M, Howden E, et al. Cardiac remodeling in response to 1 year of intensive endurance training. *Circulation.* 2014;130:2152–61.
 24. Jin H, Yang R, Li W, et al. Effects of exercise training on cardiac function, gene expression, and apoptosis in rats. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2000;279:H2994–3002.
 25. Weeks KL, McMullen JR. The athlete's heart vs. the failing heart: Can signaling explain the two distinct outcomes? *Physiology.* 2011;26:97–105.
 26. Roncancio MR. Efecto del ejercicio en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. *Rev Colomb Med Física y Rehabil.* 2010;20:24–32.
 27. Hsu C-Y, Hsieh P-L, Hsiao S-F, et al. Effects of exercise training on autonomic function in chronic heart failure: Systematic review. *Biomed Res Int.* 2015;2015:591708.
 28. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, et al., PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *Int J Surg.* 2010;8:336–41.
 29. Malik M, Bigger J, Camm A, et al. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. *Eur Heart J.* 1996;17:354–81.
 30. Traductores CCI. Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones, versión 5.1. 0. Man Cochrane Revis Sist Interv versión 510 [Internet]. 2012;(marzo):1-639.
 31. Piotrowicz E, Baranowski R, Piotrowska M, et al. Variable effects of physical training of heart rate variability, heart rate recovery, and heart rate turbulence in chronic heart failure. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2009;32.
 32. Larsen A I, Gjesdal K, Hall C, et al. Effect of exercise training in patients with heart failure: A pilot study on autonomic balance assessed by heart rate variability. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil.* 2004;11:162–7.
 33. Pietila M, Malminniemi K, Vesalainen R, et al. Exercise training in chronic heart failure: Beneficial effects on cardiac c-hydroxyephedrine PET, autonomic nervous control, and ventricular repolarization. *2002;43:773–9.*
 34. Experience from controlled trials of physical training in chronic heart failure. Protocol and patient factors in effectiveness in the improvement in exercise tolerance. European Heart Failure Training Group. *Eur Heart J.* 1998;19:466–75.
 35. Radaelli A, Meyer A, Calciati A. Physical training enhances sympathetic and parasympathetic control of heart rate and peripheral vessels in chronic heart failure. *Clin Sci (Lond).* 1996;91 Suppl:92–4.
 36. Koufaki P, Mercer TH, George KP, et al. Low-volume high-intensity interval training vs continuous aerobic cycling in patients with chronic heart failure: A pragmatic randomised clinical trial of feasibility and effectiveness. *J Rehabil Med.* 2014;46:348–56.
 37. Murad K, Brubaker PH, Fitzgerald DM, et al. Exercise training improves heart rate variability in older patients with heart failure: A randomized, controlled, single-blinded trial. *Congest Heart Fail.* 2012;18:192–7.
 38. Ricca-Mallada R, Migliaro ER, Piskorski J, et al. Exercise training slows down heart rate and improves deceleration and acceleration capacity in patients with heart failure. *J Electrocardiol.* 2012;45:214–9.
 39. Selig SE, Carey MF, Menzies DG, et al. Moderate-intensity resistance exercise training in patients with chronic heart failure improves strength, endurance, heart rate variability, and forearm blood flow. *J Card Fail.* 2004;10:21–30.
 40. Kiilavuori K, Toivonen L, Näveri H, et al. Reversal of autonomic derangements by physical training in chronic heart failure assessed by heart rate variability. *Eur Heart J.* 1995;16:490–5.
 41. Malfatto G, Branzi G, Riva B, et al. Recovery of cardiac autonomic responsiveness with low-intensity physical

- training in patients with chronic heart failure. *Eur J Hear Fail.* 2002;4:159–66.
42. Adamopoulos SN, Coats AJS, Piepoli M, et al. Effects of physical training on autonomic function in chronic heart failure. *Hell J Cardiol.* 1993;34:129–38.
43. Vanderlei LCM, Pastre CM, Hoshi RA, et al. Basic notions of heart rate variability and its clinical applicability. *Rev Bras Cir Cardiovasc.* 2009;24:205–17.
44. Negrín Expósito JE, Cordiés Jackson L, Roselló Silva N, et al. Insuficiencia cardíaca crónica. *Rev Cubana Med.* 2001;40:195–211.
45. García Manso JM. Aplicación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca al control del entrenamiento deportivo: Análisis en modo frecuencia. *Arch Med del Deport.* 2013;30:43–51.
46. Frías ML, Martínez MG, Frías MRL, et al. Beneficio del seguimiento de un programa de rehabilitación cardíaca sobre algunos parámetros de la composición corporal. *Nutr Hosp.* 2014;30:1366–74.
47. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, et al. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Med.* 2004;116:682–92.